

№25**ОХРАНА
ТРУДА НА
ПРЕДПРИЯТИИ**

БЕРЕГИТЕ РАБОТНИКА!

**Информационный листок Первичной профсоюзной организации
в ОАО "Горьковский автомобильный завод"**

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСЕ

При укусе животными:

- промыть рану проточной водой с мылом;
- остановить кровотечение:
 - ✓ механическим способом (при сильном кровотечении) - давящей повязкой;
 - ✓ химическим способом - обработать края раны йодом, зеленкой;
 - ✓ физическим способом - наложение жгута или тугий сдавливающей повязки.
- обработать края раны дезинфицирующим средством (гель, мазь);
- наложить стерильную повязку;
- направить пострадавшего в лечебное учреждение для оказания первой медицинской помощи и проведения профилактической вакцинации от бешенства.

При укусе насекомыми:

- удалить жало из ранки;
- приложить холод к месту укуса;
- при возникновении аллергической реакции обратиться к врачу;
- следить за состоянием больного до прибытия медицинского работника.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРИСТУПЕ ЭПИЛЕПСИИ

Судорожный приступ эпилепсии может испугать любого человека, особенно увидевшего его впервые. Важно понимать, что человек во время приступа ничего не осознает и не испытывает никакой боли. Приступ продолжается всего несколько минут.


Во время приступа эпилепсии необходимо:

- сохранять спокойствие, не пытаться насильно сдерживать судорожные движения, но предохранять от ушибов;
- по возможности, уложить человека с приступом эпилепсии на ровную поверхность, подложить ему под голову что-нибудь мягкое, расстегнуть воротник и освободить от стесняющей дыхание одежды;
- не перемещать человека с того места, где случился приступ, если только оно не является опасным для здоровья (имеются острые углы, горячие поверхности, близость воды и т.д.);
- для предотвращения западания языка разжать челюсти, а в случае возникновения рвоты осторожно повернуть на бок все тело;
- ни в коем случае не пытаться разжимать зубы какими-либо предметами;
- для предотвращения прикуса языка, если это возможно, между коренными зубами вставить угол полотенца или ложку, завернутую в мягкую ткань;
- не делать искусственное дыхание или массаж сердца;
- не давать никаких лекарств или жидкостей через рот.

Судороги должны прекратиться сами через несколько минут. После окончания приступа нужно дать человеку возможность спокойно прийти в себя. Нередко в завершении приступа может возникнуть спутанность сознания и слабость, и должно пройти некоторое время (от 5 до 30 мин.), после которого человек, перенесший судорожный приступ, сможет самостоятельно встать.

Если приступы продолжаются более 5 минут, затруднено дыхание или во время приступа человек получил травму, то необходимо вызвать «скорую медицинскую помощь».

ПЛАКАТЫ



ПРИ ПРИСТУПЕ ЭПИЛЕПСИИ

⚠ Не кладите ничего пациенту в рот

С ЮМОРОМ

При укусе ядовитой змеи, держите её голову на расстоянии от себя, чтобы она не укусила Вас в ответ.

* * *

Закон пирожка: Начинка всегда находится в противоположной укусу стороне т.к. она боится!